



## IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

### PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

*plan B<sup>MD</sup>*

Comprimé de lévonorgestrel à 1,5 mg

**Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie d'une monographie de produit publiée à la suite de l'approbation de la vente au Canada de Plan BMD et s'adresse tout particulièrement au consommateur. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de Plan BMD. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.**

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

Plan B<sup>MD</sup> est une méthode contraceptive d'urgence ou d'appoint.

Plan B<sup>MD</sup> peut prévenir la grossesse en cas d'échec d'une méthode contraceptive (par exemple, rupture du condom) ou lorsqu'aucune forme de contraception n'a été utilisée. Le produit offre une efficacité maximale s'il est utilisé dans les 72 heures (3 jours) suivant une relation sexuelle non protégée par un contraceptif.

Plan B<sup>MD</sup> ne peut mettre fin à une grossesse. Bien qu'il n'existe aucune preuve scientifique que Plan B<sup>MD</sup> pourrait nuire au développement d'un embryon, les femmes enceintes ne doivent pas utiliser ce produit.

Plan B<sup>MD</sup> ne doit pas être utilisé au lieu d'une méthode de contraception ordinaire, car il n'est pas aussi efficace que ces méthodes lorsqu'elles sont utilisées correctement.

##### Les effets de ce médicament :

Plan B<sup>MD</sup> est un contraceptif d'urgence qui agit en empêchant la libération d'un ovule par l'ovaire ou en empêchant la rencontre du sperme et de l'ovule. Plan B<sup>MD</sup> peut aussi prévenir l'implantation d'un ovule fécondé sur la paroi de l'utérus. Le produit n'est pas efficace une fois la grossesse établie, à savoir lorsqu'un ovule est déjà implanté sur la paroi de l'utérus. Plan B<sup>MD</sup> ne provoque pas un avortement.

Plan B<sup>MD</sup> peut être utilisé après toute relation sexuelle non protégée, y compris dans les circonstances suivantes :

- aucun moyen contraceptif n'a été utilisé;
- le moyen contraceptif utilisé a échoué, par exemple :
  - le condom s'est brisé, a glissé ou a mal été utilisé;
  - le diaphragme ou la cape cervicale s'est déplacé, s'est brisé ou a été retiré trop tôt;
  - l'homme ne s'est pas retiré à temps avant d'éjaculer;
  - la période fertile a été mal calculée si vous pratiquez l'abstinence périodique;
  - le stérilet a été expulsé;
  - vous avez oublié de prendre un comprimé contraceptif oral;
  - vous avez tardé à entamer une nouvelle plaquette de contraceptifs oraux;
  - vous avez tardé à recevoir votre injection contraceptive;
- vous avez été victime d'une agression sexuelle (viol).

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

N'utilisez pas Plan B<sup>MD</sup> si :

- vous êtes enceinte ou croyez l'être;
- vous êtes allergique au lévonorgestrel ou à l'un des ingrédients de la formulation (voir la liste des ingrédients non médicinaux ci-dessous);
- vous avez des saignements vaginaux anormaux.

##### L'ingrédient médicinaal est :

Lévonorgestrel

##### Les ingrédients non médicinaux sont :

Silice sublimée, amidon de pomme de terre, stéarate de magnésium, talc, amidon de maïs et lactose monohydraté.

##### Les formes posologiques sont :

L'emballage contient un seul comprimé de 1,5 mg de lévonorgestrel chacun. Le comprimé est blanc et rond et porte l'inscription G00.

#### MISES EN GARDES ET PRÉCAUTIONS

##### Mises en garde et précautions importantes

- **Plan B<sup>MD</sup> n'offre aucune protection contre le VIH-sida, ni aucune autre maladie transmise sexuellement (MTS) comme la syphilis, la gonorrhée, la chlamydia et l'herpès.** Si vous croyez avoir été infectée par le VIH-sida ou par toute autre maladie transmise sexuellement, parlez-en à votre médecin et demandez-lui comment vous protéger à l'avenir.
- **Si vos règles ne surviennent pas en dedans d'une (1) semaine de la date prévue, communiquez avec votre médecin et passez un test de grossesse.**

Plan B<sup>MD</sup> est un contraceptif d'urgence seulement et ne doit pas servir à la contraception courante. Plan B<sup>MD</sup> n'est pas aussi efficace pour prévenir la grossesse que la plupart des méthodes contraceptives (par ex. les contraceptifs oraux, le stérilet, l'implant ou le condom, etc.). Il ne doit pas servir à la contraception courante chez les femmes sexuellement actives.

Plan B<sup>MD</sup> empêche la grossesse à court terme seulement. Toute relation sexuelle ultérieure peut donner lieu à une grossesse si vous n'utilisez pas de méthode contraceptive. Vous devez vous abstenir de toute relation sexuelle ou utiliser une autre méthode de contraception barrière jusqu'à ce que vous ayez vos prochaines règles pour éviter de devenir enceinte.

**AVANT** d'utiliser Plan B<sup>MD</sup>, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez en ce moment ou avez déjà présenté une des affections suivantes:

- vous avez des saignements vaginaux anormaux dont la cause est inconnue;
- vous avez un cancer du sein diagnostiqué ou soupçonné;
- vous avez une maladie du foie ou une tumeur au foie;
- vous êtes diabétique;
- votre pression sanguine est élevée (maladie du cœur);
- vous êtes enceinte ou vous allaitez;
- votre poids est de 75 kg (165 lb) ou plus.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Avant d'utiliser Plan B<sup>MD</sup>, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un des médicaments suivants :

Les médicaments qui peuvent diminuer l'efficacité de Plan B<sup>MD</sup> incluent :

- les anticonvulsivants (phénytoïne, carbamazépine, primidone, phénobarbital)
- les antibiotiques (ampicilline, cotrimoxazole, tétracycline, témafloxacin, clarithromycine)
- la rifampicine
- la rifabutine
- la griséofulvine
- *Hypericum perforatum* (millepertuis)
- l'acétate d'ulipristal.

Si vos règles ne surviennent pas en dedans d'une (1) semaine de la date prévue et que vous prenez un de ces médicaments, vous devriez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien et passer un test de grossesse.

Informez votre médecin si vous avez utilisé Plan B<sup>MD</sup> dans les 3 jours précédant un test de Papanicolaou (test Pap), car cela pourrait modifier vos résultats.

#### UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

##### Dose habituelle :

Plan B<sup>MD</sup> peut prévenir la grossesse si le comprimé est pris dans les 72 heures (3 jours) et de préférence dans les 12 heures suivant l'échec d'une méthode contraceptive ou une relation sexuelle non protégée (sans utiliser de méthode contraceptive). Le traitement ne doit pas tarder. Plan B<sup>MD</sup> est plus efficace lorsqu'il est pris le plus rapidement possible après la relation sexuelle non protégée.

Plan B<sup>MD</sup> peut être pris avec un verre d'eau.

Si vous vomissez dans les deux (2) heures après avoir pris le comprimé Plan B<sup>MD</sup>, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien, car il pourrait vous prescrire une dose additionnelle.

**Important** : S'il s'est écoulé plus de 72 heures (3 jours) depuis la relation sexuelle non protégée, Plan B<sup>MD</sup> pourrait ne pas agir efficacement. Consultez votre professionnel de la santé le plus tôt possible pour discuter des autres solutions possibles.

Bien que le risque de grossesse soit maximal au milieu du cycle menstruel (possiblement aussi tôt que 10 jours après le début de vos dernières règles), une grossesse peut se produire en tout temps durant le cycle. Plan B<sup>MD</sup> peut être utilisé en tout temps durant le cycle menstruel lorsque la femme croit qu'il y a un risque de conception.

Le produit ne déclenche pas les règles. Vous pourriez avoir de légers saignements après avoir utilisé Plan B<sup>MD</sup>, mais il ne s'agit pas de vos règles. Vos prochaines règles devraient survenir au moment prévu (ou quelques jours plus tôt ou plus tard). Si vos règles tardent de plus d'une semaine ou s'il y a quoi que ce soit qui vous préoccupe, consultez votre professionnel de la santé. L'utilisation répétée du produit (plus d'une fois par cycle menstruel ou par mois) peut perturber votre cycle menstruel (règles).

Si vous êtes sexuellement active et que vous ne souhaitez pas devenir enceinte, vous devez utiliser régulièrement une méthode contraceptive. Si vous désirez obtenir plus de renseignements à ce sujet ou si la méthode que vous utilisez actuellement vous pose problème, demandez à votre professionnel de la santé qui vous aidera à choisir la méthode qui vous convient.

Plan B<sup>MD</sup> est moins efficace chez les femmes pesant 75 kg (165 lb) ou plus et inefficace chez les femmes dont le poids est supérieur à 80 kg (176 lb). Si vous pesez 75 kg ou plus, demandez à votre professionnel de la santé de vous conseiller d'autres méthodes contraceptives d'urgence.

##### Surdosage :

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, l'urgence d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.
--

Les symptômes de surdosage peuvent se manifester par des nausées, des vomissements et des saignements vaginaux qui peuvent provoquer une perturbation du cycle menstruel.

#### PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES

Plan B<sup>MD</sup> peut causer des effets secondaires temporaires chez certaines femmes. Ces effets durent généralement moins de 24 heures.

Les effets secondaires courants sont les suivants :

- **nausées** : chez environ 14 à 23 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **douleur abdominale** : chez environ 18 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **fatigue** : chez environ 17 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **maux de tête** : chez environ 17 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **étourdissements** : chez environ 11 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **sensibilité des seins** : chez environ 11 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **vomissements** : chez environ 6 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **diarrhée** : chez environ 5 % des femmes qui utilisent Plan B<sup>MD</sup>;
- **saignements menstruels irréguliers** : certaines femmes peuvent avoir de légers saignements après avoir utilisé Plan B<sup>MD</sup>; la majorité ont leurs prochaines règles au moment prévu ou un peu plus tôt. Lorsque Plan B<sup>MD</sup> est utilisé à répétition (plus d'une fois par cycle menstruel ou par mois), le cycle menstruel peut raccourcir ou rallonger et le flux menstruel peut devenir plus abondant ou plus léger.

Les effets secondaires moins courants sont la migraine ou le mal de tête intense, la douleur au bas-ventre, les règles douloureuses et les pertes vaginales. Si les symptômes persistent durant plus de 48 heures ou sont intenses, consultez votre professionnel de la santé.

**Retard des règles** : Si vos règles ne surviennent pas en dedans d'une (1) semaine de la date prévue, vous devriez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien et passer un test de grossesse.

#### EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURE À SUIVRE

Communiquez immédiatement avec votre médecin si l'un des symptômes ou signes d'effets secondaires graves suivants se manifeste :

- démangeaison et éruption cutanée;
- crampes ou douleur aiguë à l'estomac ou à l'abdomen avant le déclenchement de vos prochaines règles normales (cela peut être un signe de grossesse ectopique, un problème médical grave);
- hémorragie utérine;
- hémorragie vaginale.

#### COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conservez le comprimé Plan B<sup>MD</sup> entre 15 et 30 °C (59 et 86 °F).

Protégez-le d'une humidité excessive (conditions d'entreposage humides).

Gardez-le hors de la portée des enfants.

<p><b>DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS</b></p> <p><b>Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé au Programme Canada Vigilance de l'une des 3 façons suivantes<span> </span>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>En ligne</b> <a href="http://www.santecanada.gc.ca/medeffet">www.santecanada.gc.ca/medeffet</a></li><li>• <b>Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345;</b></li><li>• <b>En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir</b><ul style="list-style-type: none"><li>- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789</li><li>- par la poste au: <b>Programme Canada Vigilance Santé Canada Index postal 0701E Ottawa (Ontario) K1A 0K9</b></li></ul></li></ul> <p><b>Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la déclaration d'effets indésirables sont disponibles sur le site Web de MedEffet<sup>MD</sup> Canada à <a href="http://www.santecanada.gc.ca/medeffet">www.santecanada.gc.ca/medeffet</a>.</b></p> <p><i><b>REMARQUE<span> </span>: Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.</b></i></p>
---

#### POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

On peut obtenir ce document et la monographie complète du produit rédigée pour les professionnels de la santé en communiquant avec le distributeur, Laboratoires Paladin Inc. au 1-888-867-7426 ou à [www.paladinlabs.com](http://www.paladinlabs.com).

Ce dépliant a été rédigé par :  
Laboratoires Paladin Inc.  
Saint-Laurent, Canada H4M 2P2  
Dernière révision : mai 2015

Fabriqué pour :  
Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc.  
41 Moores Road, Frazer, PA 19355 USA

Ce feuillet est recyclable

CMPLBIF

**paladin**  
une compagnie de endo international